



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL IERNUT
545100 Iernut, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureș
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76
E-mail: iernut@cjmures.ro

NR. 13069 din 03.05.2018.

ANUNT

In atentia producatorilor agricoli

Alaturat prezentei anexam buletinul de avertizare nr. 15/02.05.2018, inregistrat la Primaria Orasului Iernut sub nr. 13000/03.05.2018, emis de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Oficiul Fitosanitar Mures, cu privire la aplicarea tratamentului chimic pentru combaterea viermelui pomilor fructiferi si buletinul de avertizare nr. 14/27.04.2018, inregistrat la Primaria Orasului Iernut sub nr. 13011/03.05.2018, emis de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Oficiul Fitosanitar Mures, cu privire la aplicarea tratamentului chimic pentru pentru combaterea bacteriozei si antracnozei la culturile de fasole si castraveti.

Producatorii agricoli au obligativitatea respectarii prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protectie a plantelor si completarea la zi a Registrului privind evidenta tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt inregistrate in baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesata la adresa <http://www.madr.ro>.

In conformitate cu prevederile legale trebuie respectate normele de tehnica securitatii muncii, protectia animalelor, albinelor si a mediului inconjurator, impotriva intoxicatiilor cu pesticide.

PRIMAR,
NICOARA IOAN



SECRETAR,
DORDEA LAURA

Int./Red.-2 exemplare,
P.C.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ

Str. Dezrobirii .nr. 80, Tg.Mureș
Tel/ Fax: 0265/435245

ORAȘUL IERNUT

NR. 130/11

03 (IUB) 05 (UNSI) 2018

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 14 / 27.04/2018

Vă recomandăm să aplicați un tratament chimic la faza de cotiledoane, pentru combaterea **bacteriozei** (*Pseudomonas l.*) și **antracnozei** (*Colletotrichum l.*) la culturile de fasole și castraveți folosind unul din produsele: ALCUPRAL 50 PU – 0,25% (fasole) – 0,5% (castraveți) sau BOULLIE BORDELAISE WDG – 0,75%(fasole, castraveți) sau COPAC – 0,3% (fasole, castraveți) sau CHAMP 77 WG (COPPERMAX) – 0,2%(castraveți) sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,25% (fasole) – 0,4% (castraveți).

In caz de atac al **afidelor** în soluția de stropit se poate adăuga unul din insecticidele: ACTARA 25 WG – 0,01% (0,1 kg/ha) sau DECIS EXPERT – 75 ml/ha sau FASTER 10 CE – 0,03 %.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

COORDONATOR
Dr. ing. Pogălian Maria



INTOCMIT,
Costea Gherghina




MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ

Str. Dezrobirii nr. 80, Tg. Mureș
Tel/ Fax: 0265/435245

BULETIN DE AVERTIZARE Nr 15 / 02.05 / 2018

ORAȘUL IERNUT

NR. 13.000

03 (ziua) 05 (luna) 2018 (anul)

I. Este momentul optim să aplicați un tratament chimic în perioada 07 - 09 mai 2018 pentru combaterea **VIERMELUI MERELOR** (*Carpocapsa pomonella*) gen.l., precum și a defoliatorilor, minatorilor, afidelor, păduchelui linos etc. în livezile de măr și păr, cu unul dintre următoarele insecticide: AVAUNT 150 SC - 0,033% sau AFFIRM - 3 - 4 kg/ha sau CALYPSO 480 SC - 0,02% sau CORAGEN - 0,01% sau DECIS 25WG - 0,003% sau INSEGAR 25 WG - 0,03% - 0,04% sau KARATE ZEON (NINJA) - 0,015% sau LASER 240 SC - 0,6-0,9 l/ha sau NOVADIM PROGRESS (SINORATOX 400 EC) - 0,075% - 0,1% sau PROTEUS OD 110 - 0,05% sau PYRINEX QUICK - 0,1% sau POLECI - (0,03 - 0,05 %) sau RELDAN 22 EC (PYRINEX M22) - 2,0 - 2,2 l/ha (în 1500 l apa/ha) sau VOLIAM TARGO - 0,75 - 1,1 l/ha (în 1500 l apa) - toate clasificate XI- Xn. Apariția esalonată a dăunătorului, impune repetarea tratamentului la 10-12 zile.

Perioadele călduroase favorizează apariția și dezvoltarea acarienilor. În parcelele cu rezervă de acarieni vă recomandăm să utilizați la soluția de stropit VOLIAM TARGO - 0,75 - 1,1 l/ha sau NOVADIM PROGRESS (SINORATOX 400 EC) - 0,075% - 0,1% - care controlează și acarienii.

Pentru prevenirea și combaterea bolilor la măr și păr (rapân, făinare), vă recomandăm să adăugați în soluția de stropit una din următoarele variante:

a) unul din produsele sistemice: BELLIS - 0,8 kg/ha sau CHORUS 75 WG - 0,02% sau FLINT PLUS 64 WG - 0,125% sau FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) - 0,6 l/ha sau STROBY DF - 0,013% sau SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC) - 0,2 l/ha % sau SHAVIT F 72 WDG - 0,2%;

b) un fungicid de contact pentru rapân: BRAVO 500 SC - 0,25% sau CAPTAN 80 WDG (CAIMAN) - 0,15% sau DITHANE M-45 - 0,2% sau DELAN 700 WDG - 0,05% sau FOLPAN 80 WDG - 0,15% în combinație cu un produs pentru făinare: THIOVIT JET 80 WG - 0,3% sau SULFOMAT 80 PU - 0,3% sau KUMULUS DF - 0,3%. În cazul în care în această perioadă presiunea de infecție este mare (precipitații) se recomandă contra rapânului un produs cu acțiune sistemică + unul de contact.

II. Tot în această perioadă se recomandă aplicarea tratamentului I pentru combaterea **VIERMELUI PRUNELOR** (*Laspyresia funebrana*) gen.l, precum și a viespei semintelor de prun, afidelor, defoliatorilor etc. cu unul dintre următoarele insecticide: CALYPSO 480 SC - 0,02% sau CORAGEN - 0,01% sau DECIS 25WG - 0,003% sau INSEGAR 25 WG - 0,03% sau KARATE ZEON - 0,015% sau LAMDEX 5 EC - 0,015% sau NOVADIM PROGRESS (SINORATOX 400 EC) - 0,075% - 0,1% sau PYRINEX QUICK - 0,1% (toate clasificate XI- Xn). Tratamentul se repetă la 10-12 zile.

Contra bolilor la prun (pătarea roșie, ciuruirea bacteriană și micotică, monilioză) vă recomandăm să adăugați în soluție un fungicid: BRAVO 500 SC - 0,15% sau CAPTAN 80 WP - 0,25% sau DITHANE M-45 - 0,2% sau DELAN 700 WDG - 0,05% sau FOLPAN 80 WDG - 0,2% sau MERPAN 50 WP - 0,25% sau SIGNUM - 0,05%.

III. Impotriva moniliozei, antracnozei, ciuruirii frunzelor la cires și vișin se recomandă ALCUPRAL 50 PU - 0,2% (2,0 kg/ha) sau DITHANE M-45 - 0,2% sau FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) - 0,75 l/ha sau MERPAN 50 WP - 0,2% sau ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) - 0,075-0,1% sau TOPAS 100 EC - 0,05% (0,5 l/ha) la care se va adăuga unul din insecticidele recomandate la prun pentru combaterea afidelor și altor defoliatori.

Pentru tratamentele recomandate mai sus se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înscrise pe ambalaj.

Folositi pentru tratamentele dintr-un sezon produse din grupe chimice diferite (sau cu mod de acțiune diferit) pentru a evita apariția formelor de rezistență la un anumit produs.

Norma de soluție pentru prun, par, gutui, cais, piersic este de 1000 litri soluție /ha iar la măr, cires, vișin, nuc este de 1500 litri soluție /ha.

Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului depășește 4-5 m / s.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>. Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva imbecilațiilor cu pesticide!

COORDONATOR

Dr. ing. Pogășian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina